

Detox-Aktiv

Artikelnummer 1703



Produktbeschreibung

LEXA Detox-Active - Voor stress op de basisvoeding

Toxinen kunnen voorkomen in alle paardenvoeders, of het nu gaat om graan, hooi, kuilvoer of gras. Afhankelijk van het feit of schimmels de plant al voor de oogst hebben aangetast of dat de schimmelaantasting pas na de oogst optreedt, wordt onderscheid gemaakt tussen veldschimmels en bewaarschimmels. Zowel de inname van paddenstoelen als de opname van hun secundaire metabolieten, bekend als mycotoxinen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoewel het vaak mogelijk is om schimmels te bestrijden met hitte of andere maatregelen, kunnen mycotoxinen nauwelijks worden teruggedrongen en vormen ze aanzienlijke gezondheidsrisico's, die vaak verborgen zitten in diervoeder en strooisel. De gevolgen hiervan zijn functiestoornissen van de lever, verhoogde leverwaarden, immunosuppressie, schade aan huid en slijmvliezen, vruchtbaarheidsproblemen, verminderde prestaties, diarree, koliek, nierschade en nog veel meer.

De besmetting met aflatoxinen, die een leverbeschadigende werking hebben, wordt vaak waargenomen. Deze mycotoxinen van de schimmel *Aspergillus* komen vooral voor in granen. Ochratoxine A, een mycotoxine die wordt geproduceerd in granen en voedergewassen, beschadigt de nieren en heeft een kankerverwekkend effect.

Het mycotoxine satratoxine veroorzaakt ernstige vergiftigingsverschijnselen die dodelijk kunnen zijn. Deze mycotoxine komt voor in grassen, hooi en stro en kan leiden tot laesies aan de slijmvliezen en de huid, diarree en schade aan het beenmerg. In het algemeen verhoogt een besmetting met schimmels en mycotoxinen in het voer altijd het risico op koliek.

Veel voorkomende mycotoxinen omvatten ook zearalenon, dat tot vruchtbaarheidsproblemen kan leiden door zijn oestrogeenachtige werking. Verder is er deoxynivalenol (DON), dat in hoge concentraties leidt tot een verminderde voeropname, immunosuppressie en leveraandoeningen. Zearalenon en DON zijn zeer giftige mycotoxinen die in granen worden aangetroffen.

Helaas zijn mycotoxinen onvermijdelijk in paardenvoer en in lage concentraties onproblematisch voor paarden. Schimmelaantasting en de vorming van mycotoxinen kunnen tot een minimum worden beperkt door zorgvuldige oogst, opslag en speciale behandelingsmethoden.

Voor een gezonde voeding is het essentieel om rekening te houden met dit hygiëneprobleem en het zoveel mogelijk te vermijden. Helaas komt het in de praktijk steeds vaker voor dat niet alleen basis- en krachtvoer van goede kwaliteit beschikbaar is. Tegenwoordig biedt een verstandig voedingsconcept bescherming tegen gevaarlijke gifstoffen.

Ideaal geschikt:

- voor mycotoxinebesmetting van het basisvoer
- voor leververontreiniging
- LEXA Detox-Aktiv is verkrijgbaar als smakelijke korrel en kan daarom gemakkelijk aan elk rantsoen worden toegevoegd.

customFields.custom_product_short_description



- in geval van mycotoxinebesmetting van het basisvoeder
- bij leververontreiniging
- LEXA Detox-Aktiv is verkrijgbaar als smakelijke korrel en kan daarom gemakkelijk aan elk rantsoen worden toegevoegd

customFields.migration_attribute_4_t1_product_details_167

Ingrediënten

Tarwezemelen, lijnzaad, biergist, bietenpulp, plantaardig vet (koolzaad)

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	9,0 %
Ruw vet	10,5 %
Ruwe celstof	6,0 %
ruwe as	41,5 %
Natrium	0,03 %

Toevoegingsmiddelen per kg

Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat	2,500 mg
--------------------------------------	----------

Technologische toevoegingen per kg

Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong (1g568)	300.000 mg
Bentoniet	100.000 mg

customFields.migration_attribute_4_t1_feeding_recommendation_168

Voederadvies:

Grote paarden: 150 g-200 g per dag Kleine paarden (400 tot 500 kg): 100-150 g per dag

Pony's: 50-100 g per dag

Gelijktijdige orale toediening van macroliden moet worden vermeden.



Weitere Bilder

